

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION "AQUITAINE" (Tél. (56) 92.06.25 et (56) 92.26.94)

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES, PYRÉNÉES ATLANTIQUES

ABONNEMENT ANNUEL

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes, Direction Départementale de l'Agriculture
Chemin d'Artigues, 33 - CENON

25 F.

C. C. P. : BORDEAUX 6702-46

Supplément N° 1 au Bulletin Technique N° 119 d'Août 1970

1970-25

AVERTISSEMENTS

VIGNE

Mildiou : Le traitement conseillé le 20 juillet dernier arrive en fin d'efficacité. La végétation restant toujours active, il est recommandé d'appliquer dès le début de la semaine une nouvelle pulvérisation fongicide sur l'ensemble du vignoble. Cette application devra être particulièrement soignée dans les parcelles présentant des anciennes taches susceptibles d'être à l'origine de nouvelles contaminations à l'occasion d'orages locaux.

Black-Rot : Le traitement ci-dessus sera également valable contre les infections de Black-Rot sur les grappes.

Cicadelles (*Empoasca flavescens*) :

Nous rappelons qu'il n'est nécessaire de traiter que dans le cas où les pullulations de larves atteignent le seuil critique de 1 larve par feuille sur une moyenne de 200 à 300 feuilles examinées au hasard. Cette population est rarement atteinte cette année et les traitements doivent demeurer exceptionnels.

Araignées jaunes (*Eotetranychus Carpini*) :

Les symptômes d'invasion d'Araignées jaunes sont peu fréquents, cette espèce paraissant en régression depuis deux ans. Les cas où une intervention est nécessaire sont très rares et localisés à quelques parcelles. Nous rappelons que le seuil de nuisibilité au-dessous duquel il n'est pas utile de traiter se situe entre 30 et 50 formes mobiles par feuille. En cas de doute, les viticulteurs peuvent nous adresser pour examen, des échantillons de feuilles de vigne.

INFORMATION

Oïdium :

On note une extension de la maladie sur les grains de raisin dans certains vignobles. Appliquer un traitement, de préférence par poudrage, dans les parcelles infestées.

.../...

P395

.../...

AVERTISSEMENTS

ARBRES FRUITIERS

Carpocapse des pommes et des poires :

Appliquer un nouveau traitement dès réception de ce bulletin, pour lutter contre la deuxième génération.

Carpocapse des prunes :

Dans les vergers mal protégés et dont la récolte est faible, l'attaque de carpocapse des prunes atteint 30 à 40 % des fruits. Outre les dégâts directs occasionnés par le ravageur dont l'activité se poursuit, les fruits gommeux peuvent favoriser l'implantation du Monilia. Il est donc indispensable de procéder à une nouvelle pulvérisation insecticide dès à présent.

Tordeuse orientale :

Le piégeage des papillons est en augmentation depuis quelques jours. Poursuivre la protection des pêches à l'aide d'une pulvérisation à base de Mévinphos sur les variétés à récolter avant le 15 août, et avec l'un des autres produits homologués pour les variétés plus tardives.

BORDEAUX, le 3 Août 1970

L'Ingénieur en Chef et l'Ingénieur d'Agronomie
chargés des Avertissements Agricoles
C. ROUSSEL et J. TOUZEAU

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription Phytosanitaire
" Aquitaine "
M. LARGE